

Symptômes pour lesquels l'élève doit demeurer à la maison pour une période de 24 h

Si votre enfant présente des symptômes parmi ceux indiqués dans la liste ci-dessous, il doit demeurer à la maison et éviter les contacts avec les autres personnes. Attendez 24 h et réévaluez l'évolution des symptômes.



Fièvre

Enfant de **0-5 ans** :

- température **rectale** de 38,5 °C (101,3 °F) et plus

Enfant de **6 ans et plus** :

- température **buccale** de 38,1 °C (100,6 °F) et plus



Symptômes généraux

- Perte soudaine d'odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte de goût
- Grande fatigue
- Perte d'appétit importante
- Douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique)



Symptômes respiratoires

- Toux (nouvelle ou aggravée)
- Essoufflement, difficulté à respirer
- Mal de gorge
- Nez qui coule ou nez bouché



Symptômes gastro-intestinaux

- Nausées
- Vomissements
- Diarrhée
- Maux de ventre

Après 24 h d'observation

- En présence des critères de symptômes décrits dans les encadrés qui suivent, l'élève doit être retiré du milieu scolaire et devrait être dépisté pour la COVID-19.
- Si le dépistage est refusé par le parent, l'élève devra demeurer au moins 10 jours à la maison.
- Si le dépistage est effectué, le parent devra suivre les consignes qui lui sont données au moment de la réception du résultat du test.

Groupe A

UN des symptômes du **groupe A** et qui persiste pendant 24 h ou plus après son apparition :

- fièvre : température buccale 38,1 °C;
- perte du goût ou de l'odorat;
- symptômes respiratoires : toux (nouvelle ou aggravée), essoufflement, difficultés à respirer.

OU

Groupe B

A au moins **DEUX** symptômes du **groupe B** et qui persistent pendant 24 h ou plus après leur apparition :

- maux de ventre;
- vomissements;
- diarrhée;
- mal de gorge;
- rhinorrhée (nez qui coule) ou congestion nasale;
- grande fatigue;
- perte d'appétit importante;
- douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique).

Si, après 24 h, l'élève présente un seul symptôme du groupe B : il peut retourner à l'école s'il ne fait pas de fièvre sans prendre d'antipyrétique (ibuprofène, ex. Advil, Motrin, etc.) s'il n'a pas vomi depuis 24 h et qu'il est assez en forme pour suivre les activités.